

Bündnis Gesund Aufwachsen in Brandenburg


Unterarbeitsgruppe Impfprävention

Entwicklung ausgewählter Impfquoten im Land Brandenburg im Zeitraum von 2009 bis 2011

Detlef Berndt, Referatsleiter GBE / Infektionsschutz

Zossen, 05.12.2011


Ausgewählte Impfquoten von Kindern im Alter von 30 bis 42 Monaten, Land Brandenburg, 2009 - 2010



GI = Grundimmunisierung abgeschlossen

Quelle: LUGV, Abt. Gesundheit


Ausgewählte Impfquoten von Schulabgängern / Schülern der 10. Klassen, Land Brandenburg, 2009 - 2010



GI = Grundimmunisierung abgeschlossen, 1.A = 1. Auffrischung

Quelle: LUGV, Abt. Gesundheit


HPV-Impfquote bei Mädchen der 10. Klassen, Land Brandenburg, 2008-2010



N = Anzahl der Schüler mit überprüfem Impfdokument

Quelle: LUGV, Abt. Gesundheit

Ausgewählte Impfquoten von Einschülern, Land Brandenburg, 2009 - 2011



GI = Grundimmunisierung abgeschlossen, 1.A = 1. Auffrischung

Quelle: LUGV, Abt. Gesundheit

Zusammenfassung I

- **Aus dem Jahr 2011 liegen bereits die Impfquoten für die Einschüler vor**
- **Einschüler 2011**
 - Zunahme des Anteils nicht gegen Hepatitis B geimpfter Kinder (2009–2011: 2,6% / 3,1% / 3,7%)
 - Trotz deutlicher Steigerung der Impfquote unzureichende Immunisierung gegen Pneumokokken
 - Trotz gleichzeitiger Einführung im Jahr 2006 deutlich unterschiedliche Entwicklung der Quoten bei den Impfungen gegen Meningokokken und Pneumokokken
 - Nur ein Drittel bekam eine Auffrischimpfung gegen Pertussis
 - Impfquote bei Masern (2 mal) fällt unter 95%
 - Verringerung fast aller Impfquoten (Ausnahmen: Pneumokokken-, Varizellen-, Meningokokken)
 - Abnahme des Anteils der vorgelegten Impfausweise (2009 – 2011: 93,5% / 93,7% / 92,9%)
 - Impfquoten sind abhängig vom Sozialstatus der Kinder

Zusammenfassung II

- **Rückblick auf 2010**
 - **Kinder im Alter von 30 bis 42 Monaten**
 - Hohe Impfquoten bei der Grundimmunisierung gegen Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Hib und Polio
 - Zweimalige MMR-Impfung nicht ausreichend
 - Impfquote gegen Hepatitis B noch zu gering
 - **Schulabgangsuntersuchungen / Zehntklässler 2010**
 - Fast jeder Zehnte ohne zweimalige Impfdosis MMR
 - Ein Viertel ohne abgeschlossene Grundimmunisierung gegen Hepatitis B
 - Ein Drittel ohne Auffrischimpfung gegen Poliomyelitis
 - Ein Drittel ohne zweite Auffrischimpfung gegen Tetanus und Diphtherie
 - Ein Viertel ohne Auffrischimpfung gegen Pertussis
 - Zwei Drittel der Mädchen ohne Impfung gegen HPV-Infektionen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!